

内蒙古自治区“双通道”管理药品目录

序号	药品名称	备注
1	注射用艾普拉唑钠	限: 1.预防重症患者应激性溃疡出血; 2.消化性溃疡出血。
2	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅱ)	限活动性良性胃溃疡。
3	安奈拉唑钠肠溶片	限十二指肠溃疡。
4	替戈拉生片	限: 1.反流性食管炎; 2.十二指肠溃疡; 3.与适当的抗生素联用以根除幽门螺杆菌。
5	盐酸凯普拉生片	限: 1.十二指肠溃疡; 2.反流性食管炎; 3.与适当的抗生素联用以根除幽门螺杆菌。
6	甲磺酸多拉司琼注射液	
7	昂丹司琼口溶膜	
8	奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊	
9	门冬氨酸鸟氨酸颗粒	限因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症。
10	磷酸钠盐散	
11	芦比前列酮软胶囊	限成人慢性特发性便秘的治疗。
12	复方聚乙二醇(3350)电解质散	
13	美沙拉秦肠溶缓释胶囊	
14	德谷门冬双胰岛素注射液	限其他胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者。
15	德谷胰岛素利拉鲁肽注射液	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。
16	甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ)	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。
17	甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅱ)	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。
18	依柯胰岛素注射液	限其他胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者。
19	盐酸二甲双胍缓释片(Ⅳ)	
20	西格列汀二甲双胍缓释片(Ⅱ)	
21	达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ)	
22	恒格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ)	限2型糖尿病患者。
23	恒格列净二甲双胍缓释片(Ⅱ)	限2型糖尿病患者。
24	磷酸瑞格列汀片	
25	苯甲酸福格列汀片	
26	考格列汀片	
27	度拉糖肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
28	聚乙二醇洛塞那肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
29	司美格鲁肽注射液	限: 1.接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者; 2.降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件(心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中)

30	脯氨酸恒格列净片	限成人2型糖尿病患者。
31	脯氨酸加格列净片	限2型糖尿病患者。
32	西格列他钠片	
33	多格列艾汀片	限2型糖尿病患者。
34	麦格司他胶囊	限C型尼曼匹克病患者。
35	阿加糖酶 α 注射用浓溶液	限法布雷病(α -半乳糖苷酶A缺乏症)患者的长期酶替代治疗,适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在0-6岁儿童中的安全性和有效性。
36	酒石酸艾格司他胶囊	限经CYP2D6基因型检测为弱代谢型(PMs)、中间代谢型(IMs)或快代谢型(EMs)的I型戈谢病(GD1)成年患者。
37	贝米肝素钠注射液	
38	司来帕格片	限WHO功能分级Ⅱ级-Ⅲ级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。
39	贝前列素钠缓释片	限WHO功能分级Ⅰ级-Ⅲ级的肺动脉高压(PAH, WHO第1组)的患者,以改善患者的运动能力。
40	注射用阿替普酶	限急性心肌梗死发病12小时内、脑梗死发病3小时内的溶栓治疗。
41	注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂	限急性心肌梗死发病6小时内、急性缺血性卒中4.5小时内的溶栓治疗。
42	注射用甲磺酸萘莫司他	
43	注射用重组人凝血因子Ⅷa	限下列患者群体出血的治疗,以及外科手术或有创操作出血的防治:1.凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5个Bethesda单位(BU)的先天性血友病患者;预计对注射凝血因子Ⅷ或凝血因子Ⅸ,具有高记忆应答的先天性血友病患者;2.获得性血友病患者;3.先天性凝血因子Ⅶ(FVII)缺乏症患者;4.具有血小板膜糖蛋白Ⅱb-Ⅲa(GPⅡb-Ⅲa)和/或人白细胞抗原(HLA)抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血
44	重组人血小板生成素注射液	限实体瘤化疗后所致的血小板减少症或原发免疫性血小板减少症(ITP)。
45	注射用尖吻蝮蛇血凝酶	
46	海曲泊帕乙醇胺片	限:1.既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)成人患者;2.对免疫抑制治疗(IST)疗效不佳的重型再生障碍性贫血(SAA)成人患者。
47	注射用罗普司亭	限对其他治疗(例如皮质类固醇、免疫球蛋白)治疗反应不佳的成人(≥ 18 周岁)慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)患者。
48	芦曲泊帕片	限计划接受手术(含诊断性操作)的慢性肝病伴血小板减少症的成年患者。
49	注射用罗普司亭N01	限对其他治疗(例如皮质类固醇、免疫球蛋白)治疗反应不佳的成人(≥ 18 周岁)慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)患者。
50	重组人凝血酶	限成人经标准外科止血技术(如缝合、结扎或电凝)控制出血无效或不可行,促进手术创面渗血或毛细血管和小静脉出血的止血。
51	异麦芽糖酐铁注射液	限口服铁剂无效或无法口服补铁;或临幊上需要快速补充铁。
52	羧基麦芽糖铁注射液	限治疗 ≥ 1 周岁儿童及成人缺铁患者:口服铁剂治疗无效时;无法口服补铁时;临幊上需要快速补充铁时。
53	甲氧聚二醇重组人促红素注射液	限因慢性肾脏病引起的贫血,且正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者。

54	注射用罗特西普	限：1.极低危、低危和中危骨髓增生异常综合征引起的贫血且需要定期输注红细胞的成人患者；2.β-地中海贫血成人患者。
55	达依泊汀α注射液	限接受血液透析的成人慢性肾脏病患者(CKD)的贫血。
56	恩那度司他片	限非透析的成人慢性肾脏病(CKD)患者。
57	培莫沙肽注射液	限因慢性肾脏病引起的贫血，包括：1.未接受红细胞生成刺激剂(ESA)治疗的成人非透析患者；2.正在接受短效促红细胞生成素治疗的成人透析患者。
58	琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的低血容量患者。
59	多种油脂肪乳注射液(C6~24)	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
60	中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
61	结构脂肪乳(20%)/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
62	小儿多种维生素注射液(13)	限与肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付。
63	注射用多种维生素(13)	限与肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付。
64	ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
65	中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
66	复方氨基酸(16AA)/葡萄糖(12.6%)电解质注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
67	艾考糊精腹膜透析液	
68	门冬氨酸钾镁木糖醇注射液	限洋地黄中毒引起的心律失常患者。
69	枸橼酸钠血滤置换液	
70	磷/碳酸氢钠血滤置换液	限：1.连续性肾脏替代治疗(CRRT)期间用于急性肾损伤的治疗；2.肾脏替代治疗启动后，当pH、钾和磷酸盐浓度恢复正常时的急性后期治疗。
71	拉那利尤单抗注射液	限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)发作。
72	维立西呱片	限心力衰竭失代偿经静脉治疗后病情稳定的射血分数降低(射血分数<45%)的症状性慢性心力衰竭成人患者。
73	注射用重组人脑利钠肽	限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗。住院方可支付，单次支付不超过3天。
74	丹参酮ⅡA磺酸钠注射液	
75	玛伐凯泰胶囊	限纽约心脏协会(NYHA)心功能分级Ⅱ-Ⅲ级的梗阻性肥厚型心肌病(oHCM)成人患者。
76	波生坦片	限WHO功能分级Ⅱ级-Ⅳ级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。
77	非奈利酮片	限2型糖尿病相关的慢性肾脏病成人患者。

78	依普利酮片	
79	注射用盐酸兰地洛尔	限：1.手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速；2.手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速；3.心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗：心房纤颤、心房扑动。
80	氨氯地平叶酸片(Ⅱ)	限伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的原发性高血压。
81	阿利沙坦酯片	限轻、中度原发性高血压。
82	美阿沙坦钾片	
83	阿利沙坦酯氨氯地平片	限原发性高血压。
84	非诺贝酸片	
85	海博麦布片	限原发性(杂合子家族性或非家族性)高胆固醇血症。
86	依洛尤单抗注射液	限：1.降低心血管事件的风险：在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；2.原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症(杂合子家族性和非家族性)或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平：在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；3.纯合子型家族性高胆固醇血症：用于成人或12岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。可与饮食疗法和其他降低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)治疗(例如他汀类药物、依折麦布、LDL分离术)合用，用于患有纯合子型家族性高胆固醇血症
87	托莱西单抗注射液	限在接受中等剂量或中等剂量以上他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者。
88	瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ)	限：1.他汀类药物单药治疗LDL-C无法达标的成人原发性(杂合子型家族性或非家族性)高胆固醇血症或混合性高脂血症患者；2.降低纯合子型家族性高胆固醇血症(HoFH)患者的TC和LDL-C水平。
89	依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ)	限：1.他汀类药物单药治疗LDL-C无法达标的成人原发性(杂合子型家族性或非家族性)高胆固醇血症或混合性高脂血症患者；2.降低纯合子型家族性高胆固醇血症(HoFH)患者的TC和LDL-C水平。
90	盐酸奈康唑乳膏	
91	本维莫德乳膏	限成人轻至中度稳定性寻常型银屑病的局部治疗。
92	度普利尤单抗注射液	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。
93	克立硼罗软膏	限3月龄及以上的轻度至中度特应性皮炎患者。
94	阿布昔替尼片	限其他系统治疗(如激素或生物制剂)应答不佳或不适宜上述治疗的难治性、中重度特应性皮炎成人和12岁及以上青少年患者。
95	克霉唑阴道膨胀栓	限念珠菌性外阴阴道病。
96	黄体酮注射液(Ⅱ)	限辅助生殖技术(ART)中黄体酮的补充治疗，适用于不能使用或不能耐受阴道制剂的女性。

97	醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式)	限：1.肢端肥大症患者；2.不可切除、高分化或中分化、局部晚期或转移性胃肠胰神经内分泌瘤(GEP-NETs)的成人患者；3.类癌综合征成人患者。
98	布地奈德肠溶胶囊	限具有进展风险的原发性免疫球蛋白A肾病(IgAN)成人患者。
99	注射用甲苯磺酸奥马环素	
100	甲苯磺酸奥马环素片	
101	注射用头孢唑林钠/氯化钠注射液	
102	注射用头孢西丁钠/氯化钠注射液	
103	盐酸头孢卡品酯颗粒	
104	注射用头孢他啶/氯化钠注射液	
105	注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液	
106	注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液	
107	注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液	
108	注射用头孢他啶阿维巴坦钠/氯化钠注射液	
109	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠/氯化钠注射液	
110	注射用头孢比罗酯钠	限成人以下感染方予支付：1.医院获得性肺炎(HAP)，但呼吸机相关性肺炎(VAP)除外；2.社区获得性肺炎(CAP)。
111	妥布霉素吸入溶液	限成人伴肺部铜绿假单胞菌感染的支气管扩张症。
112	苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液	限对奈诺沙星呈现敏感的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的成人(≥18岁)社区获得性肺炎。
113	注射用磷酸左奥硝唑酯二钠	限：1.肠道和肝脏严重的阿米巴病；2.奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术后感染；3.预防外科手术导致的敏感厌氧菌感染。
114	康替唑胺片	限对本品敏感的金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感和耐药的菌株)、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的复杂性皮肤和软组织感染。
115	注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物	
116	硫酸艾沙康唑胶囊	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。
117	奥特康唑胶囊	限重度外阴阴道假丝酵母菌病(VVC)。
118	对氨基水杨酸肠溶颗粒	
119	艾米替诺福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。
120	恩替卡韦颗粒	限乙型肝炎。
121	来迪派韦索磷布韦片	限成人和12至<18岁青少年的慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。
122	索磷布韦维帕他韦片	限成人慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。
123	盐酸可洛派韦胶囊	限基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎。
124	索磷维伏片	限既往接受过含直接抗病毒药物(DAA)方案、无肝硬化或伴代偿性肝硬化(Child-Pugh A)的成人慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。

125	磷酸依米他韦胶囊	限与索磷布韦片联合,用于治疗成人基因1型非肝硬化慢性丙型肝炎。
126	奥磷布韦片	限基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎。
127	艾考恩丙替片	限艾滋病病毒感染。
128	比克恩丙诺片	限艾滋病病毒感染。
129	艾诺韦林片	限艾滋病病毒感染。
130	拉米夫定多替拉韦片	限艾滋病病毒感染。
131	多拉米替片	限艾滋病病毒感染。
132	阿兹夫定片	
133	艾诺米替片	限艾滋病病毒感染。
134	盐酸阿比多尔颗粒	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。
135	来特莫韦注射液	限接受异基因造血干细胞移植(HSCT)的巨细胞病毒(CMV)血清学阳性的成人和6个月及以上且体重 ≥ 6 kg的儿童受者[R+]预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病。
136	氢溴酸氘瑞米德韦片	限轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)的成年患者。
137	来瑞特韦片	限轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)的成年患者。
138	先诺特韦片/利托那韦片组合包装	限轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)成年患者。
139	阿泰特韦片/利托那韦片组合包装	限轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)的成年患者。
140	玛巴洛沙韦干混悬剂	限5至12岁以下单纯性甲型和乙型流感儿童患者。
141	马立巴韦片	限治疗造血干细胞移植或实体器官移植后巨细胞病毒(CMV)感染和/或疾病,且对一种或多种既往治疗(更昔洛韦、缬更昔洛韦、西多福韦或膦甲酸钠)难治(伴或不伴基因型耐药)的成人患者。
142	注射用紫杉醇聚合物胶束	限联合铂类用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。
143	示踪用盐酸米托蒽醌注射液	限甲状腺手术区域淋巴结或乳腺癌前哨淋巴结的示踪。
144	盐酸米托蒽醌脂质体注射液	限既往至少经过一线标准治疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)成人患者。
145	优替德隆注射液	限既往接受过至少一种化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。
146	盐酸埃克替尼片	限: 1.表皮生长因子受体(EGFR)基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗; 2.既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC); 3.Ⅱ-ⅢA期伴有表皮生长因子受体(EGFR)基因敏感突变非小细胞肺癌(NSCLC)术后辅助治疗。
147	甲磺酸阿美替尼片	限: 1.表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗; 2.既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗; 3.既往接受过手术切除治疗的Ⅱ-ⅢIB期具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的成人非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗; 4.接受含铂放化疗期间或之后未出现疾病进展,及具有EGFR外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期、不可切除(Ⅲ期)NSCLC
148	维莫非尼片	限BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。

149	甲磺酸达拉非尼胶囊	限：1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合曲美替尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者； 2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合曲美替尼适用于BRAF V600 突变阳性的Ⅲ期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗； 3.BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合曲美替尼适用于治疗BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。
150	盐酸阿来替尼胶囊	限：1.间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的 I B期至Ⅲ A期非小细胞肺癌患者术后辅助治疗； 2.间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。
151	布格替尼片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌(NSCLC)患者。
152	洛拉替尼片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。
153	曲美替尼片	限：1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者； 2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于BRAF V600 突变阳性的Ⅲ期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗； 3.BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。
154	硫酸氢司美替尼胶囊	限3岁及3岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤(PN)的I型神经纤维瘤病(NF1)儿童患者。
155	阿贝西利片	限：1.联合内分泌治疗(他莫昔芬或芳香化酶抑制剂)用于激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性、淋巴结阳性，高复发风险的早期乳腺癌成人患者的辅助治疗； 2.激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌：与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗；与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。
156	琥珀酸瑞波西利片	限：1.与芳香化酶抑制剂联合使用作为激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性高复发风险的早期乳腺癌患者的辅助治疗； 2.激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌，与芳香化酶抑制剂联合用药作为女性患者的初始内分泌治疗。
157	磷酸芦可替尼片	限：1.中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)(亦称为慢性特发性骨髓纤维化)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的成年患者； 2.对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的12岁及以上急性移植物抗宿主病(急性GVHD)或慢性移植物抗宿主病(慢性GVHD)患者。
158	呋喹替尼胶囊	限：1.既往接受过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子(VEGF)治疗、抗表皮生长因子受体(EGFR)治疗(RAS野生型)的转移性结直肠癌(mCRC)患者； 2.联合信迪利单抗注射液用于既往系统性抗肿瘤治疗后失败且不适合进行根治性手术治疗或根治性放疗的晚期错配修复完整(pMMR)子宫内膜癌患者。
159	泽布替尼胶囊	限：1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者； 2.成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者； 3.成人华氏巨球蛋白血症(WM)患者； 4.联合奥妥珠单抗用于既往接受过至少二线系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤(FL)成人患者。
160	阿可替尼胶囊	限：1.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者； 2.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。

161	奥布替尼片	限：1.成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者；2.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者；3.既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤(MZL)患者。
162	恩曲替尼胶囊	限：1.1月龄及以上，经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶(NTRK)融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者；2. ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
163	瑞派替尼片	限既往接受过3种或以上激酶抑制剂(包括伊马替尼)的晚期胃肠间质瘤(GIST)成人患者。
164	甲磺酸氟马替尼片	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者。
165	盐酸安罗替尼胶囊	限：1.既往至少接受过2种系统化治疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体(EGFR)基因突变或间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化治疗后出现进展或复发；2.既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗；3.腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗；4.局部晚期或转移性软组织肉瘤患者的一线治疗；5.具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗；6.进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型
166	甲磺酸阿帕替尼片	限：1.既往至少接受过2种系统化治疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者；2.既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者；3.不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗；4.联合氟唑帕利用于新辅助、辅助或转移阶段接受过化疗治疗的伴有胚系BRCA突变(gBRCAm)的人表皮生长因子受体(HER2)阴性转移性乳腺癌成年患者，激素受体(HR)阳性乳腺癌患者既往需接受过内分泌治疗或被认为不适合接受内分泌治疗。
167	马来酸吡咯替尼片	限：1.表皮生长因子受体2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者；2.表皮生长因子受体2(HER2)阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗。
168	甲苯磺酸多纳非尼片	限：1.既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者；2.进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。
169	盐酸恩沙替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌(NSCLC)患者。
170	甲磺酸伏美替尼片	限：1.表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；2.既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。
171	索凡替尼胶囊	限无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好(G1、G2)的胰腺和非胰腺来源的神经内分泌瘤。
172	赛沃替尼片	限携带间质-上皮转化因子(MET)外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
173	奥雷巴替尼片	限：1.对一代和二代酪氨酸激酶抑制剂耐药和/或不耐受的慢性髓细胞白血病慢性期成年患者；2.T315I突变的慢性髓细胞白血病慢性期或加速期的成年患者。

174	甲磺酸贝福替尼胶囊	限：1.表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；2.既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
175	伏罗尼布片	限既往接受过酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的晚期肾细胞癌(RCC)患者。
176	谷美替尼片	限具有间质-上皮转化因子(MET)外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。
177	伊鲁阿克片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者。
178	盐酸卡马替尼片	限未经系统治疗的携带间质上皮转化因子(MET)外显子14跳跃突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
179	盐酸特泊替尼片	限携带间质上皮转化因子(MET)外显子14跳跃突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
180	戈利昔替尼胶囊	限既往至少接受过一线系统性治疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(r/r PTCL)成人患者。
181	甲磺酸瑞厄替尼片	限：1.具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；2.既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的治疗。
182	甲磺酸瑞齐替尼胶囊	限：1.具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子 21(L858R)置换突变的局部晚期或复发转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；2.既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的治疗。
183	瑞普替尼胶囊	限ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
184	舒沃替尼片	限既往经含铂化疗治疗时或治疗后出现疾病进展，或不耐受含铂化疗，并且检测确认存在表皮生长因子受体(EGFR)20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的成人患者。
185	枸橼酸依奉阿克胶囊	限未经过间变性淋巴瘤激酶(ALK)抑制剂治疗的ALK阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者。
186	富马酸安奈克替尼胶囊	限ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
187	硫酸拉罗替尼胶囊	限经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶(NTRK)融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。
188	硫酸拉罗替尼口服溶液	限经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶(NTRK)融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。
189	妥拉美替尼胶囊	限含抗PD-1/PD-L1治疗失败的NRAS基因突变的晚期黑色素瘤患者。
190	伯瑞替尼肠溶胶囊	限：1.具有间质-上皮转化因子(MET)外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者；2.具有间质-上皮转化因子(MET)扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者；3.既往治疗失败的具有PTPRZ1-MET融合基因的IDH突变型星形细胞瘤(WHO4级)或有低级别病史的胶质母细胞瘤成人患者。

191	奥妥珠单抗注射液	限与化疗联合，用于初治的Ⅱ期伴有巨大肿块、Ⅲ期或Ⅳ期滤泡性淋巴瘤成人患者，达到至少部分缓解的患者随后用奥妥珠单抗维持治疗。
192	达雷妥尤单抗注射液	限：1.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3.单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现
193	达雷妥尤单抗注射液(皮下注射)	限：1.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3.与泊马度胺和地塞米松联合用药治疗既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂)的多发性骨髓瘤患者；4.单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展；5.新诊断的原发性轻链型淀粉样变患者。本方案不适合也不推荐用于患有NYHA ⅢB级或Ⅳ级心脏疾病或Mayo ⅢB期的原发性轻链型淀粉样变患者。
194	曲妥珠单抗注射液(皮下注射)	限：1.HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过12个月；2.HER2阳性的转移性乳腺癌。
195	注射用恩美曲妥珠单抗	限：1.接受了紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后仍残存侵袭性病灶的HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗；2.限接受了紫杉烷类和曲妥珠单抗治疗的HER2阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者。
196	注射用德曲妥珠单抗	限：1.既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的不可切除或转移性HER2阳性成人乳腺癌患者；2.既往在转移性疾病阶段接受过至少一种系统治疗的，或在辅助化疗期间或完成辅助化疗之后6个月内复发的，不可切除或转移性HER2低表达(IHC 1+或IHC 2+/ISH-)成人乳腺癌患者。
197	西妥昔单抗注射液	限：1.RAS基因野生型的转移性结直肠癌；2.头颈部鳞状细胞癌。
198	西妥昔单抗β注射液	限与FOLFIRI方案联合用于一线治疗RAS/BRAF基因野生型的转移性结直肠癌。

199	替雷利珠单抗注射液	<p>限：1.PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗；2.联合紫杉醇和卡铂或注射用紫杉醇(白蛋白结合型)和卡铂用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；3.联合培美曲塞和铂类化疗用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；4.用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者，以及EGFR和ALK阴性或未知的，既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性鳞状NSCLC成人患者；5.联合含铂化疗新辅助治疗，并在手术后继续单药辅助治疗，用于可切除的II期或IIIA期非小细胞肺癌患者的治疗；6.联合依托泊苷和铂类化疗用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的一线治疗；7.不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗；8.既往接受过索拉非尼或仑伐替尼或含奥沙利铂全身化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗；9.不可切除或转移性微卫星高度不稳定型(MSI-H)或错配修复基因缺陷型(dMMR)的成人晚期实体瘤患者：既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者；既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者；10.联合紫杉醇和铂类药物或含氟尿嘧啶类和铂类药物用于不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗；11.既往接受过一线标准化疗后进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌的治疗；12.联合吉西他滨和顺铂用于复发或转移性鼻咽癌的一线治疗；13.联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌患者的一线治疗。</p>
200	特瑞普利单抗注射液	<p>限：1.既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗；2.不可切除或转移性黑色素瘤的一线治疗；3.含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗；4.既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗；5.联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗；6.联合紫杉醇和顺铂适用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌的一线治疗；7.联合培美曲塞和铂类适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗；8.联合含铂化疗围手术期治疗，继之本品单药作为辅助治疗，用于可切除IIIA-IIIB期非小细胞肺癌(NSCLC)的成人患者；9.联合阿昔替尼用于中高危的不可切除或转移性肾细胞癌患者的一线治疗；10.联合依托泊苷和铂类用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的一线治疗；11.联合注射用紫杉醇(白蛋白结合型)用于经充分验证的检测评估PD-L1阳性(CPS≥1)的复发或转移性三阴性乳腺癌(TNBC)的一线治疗；12.联合贝伐珠单抗用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。</p>

201	信迪利单抗注射液	限：1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗；2.非鳞状非小细胞肺癌：(1)联合培美曲塞和铂类化疗，用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗；(2)联合贝伐珠单抗、培美曲塞和顺铂，用于经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗失败的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗；3.联合吉西他滨和铂类化疗，用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗；4.联合贝伐珠单抗，用于既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的一线治疗；5.联合紫杉醇和顺铂或氟尿嘧啶和顺铂用于不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞癌的一线治疗；6.联合含氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于不可切除的局部晚期、复发或转移性胃及胃食管交界处腺癌的一线治疗；7.联合呋喹替尼胶囊用于既往系统性抗肿瘤治疗后失败且不适合进行根治性手术治疗或根治性放疗的晚期
202	注射用卡瑞利珠单抗	限：1.既往接受过索拉非尼治疗和/或仑伐替尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗；2.联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗；3.既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗；4.既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗；5.联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗；6.联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗；7.联合紫杉醇和卡铂用于局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗；8.联合甲磺酸阿帕替尼用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗；9.联合苹果酸法米替尼治疗既往经过含铂化疗但未经过贝伐珠单抗治疗的复发或转移性宫颈癌患者。
203	恩朗苏拜单抗注射液	限既往接受含铂化疗治疗失败的PD-L1表达阳性(CPS≥1)的复发或转移性宫颈癌患者。
204	赛帕利单抗注射液	限：1.既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性且PD-L1表达阳性(CPS≥1)的宫颈癌患者；2.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者。
205	注射用维布妥昔单抗	限以下CD30阳性淋巴瘤成人患者：1.复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤(R/R sALCL)；2.复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤(R/R cHL)；3.既往接受过系统性治疗的原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤(pcALCL)或蕈样真菌病(MF)。
206	泽贝妥单抗注射液	限CD20阳性弥漫大B细胞淋巴瘤，非特指性(DLBCL, NOS)成人患者。
207	瑞帕妥单抗注射液	限国际预后指数(IPI)为0~2分的新诊断CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤(DLBCL)成人患者。
208	尼妥珠单抗注射液	限：1.与放疗联合治疗局部晚期鼻咽癌；2.与同步放化疗联合治疗局部晚期头颈部鳞癌。
209	注射用伊尼妥单抗	限接受过1个或多个化疗方案的HER2阳性转移性乳腺癌患者。
210	依沃西单抗注射液	限：1.联合培美曲塞和卡铂，用于经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗后进展的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗；2.经国家药品监督管理局批准的检测评估为PD-L1肿瘤比例分数(TPS)≥1%的表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌一线治疗。

211	卡度尼利单抗注射液	限：1.既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗；2.联合紫杉醇和铂类化疗药物联合或不联合贝伐珠单抗用于持续、复发或转移性宫颈癌的一线治疗；3.联合含氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于局部晚期不可切除或转移性胃或胃食管结合部腺癌患者的一线治疗。
212	注射用维泊妥珠单抗	限：1.既往未经治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者；2.不适合接受造血干细胞移植的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者。
213	帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射)	限：1.HER2阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者(直径 > 2cm或淋巴结阳性)的新辅助治疗；2.具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗；3.既往未接受过针对转移性乳腺癌的抗HER2治疗或者化疗的HER2阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者。
214	重组人血管内皮抑制素注射液	限晚期非小细胞肺癌患者。
215	西达本胺片	限：1.既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者；2.联合R-CHOP(利妥昔单抗、环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和强的松)用于MYC和BCL2表达阳性的既往未经治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者。
216	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	限：1.晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2.铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。
217	氟唑帕利胶囊	限：1.既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变(gBRCAm)的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的患者；2.铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；3.晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；4.单药或联合甲磺酸阿帕替尼用于新辅助、辅助或转移阶段接受过化疗治疗的伴有胚系BRCA突变(gBRCAm)的人表皮生长因子受体(HER2)阴性转移性乳腺癌成年患者。激素受体(HR)阳性乳腺癌患者既往需接受过内分泌治疗或被认为不适合接受内
218	帕米帕利胶囊	限既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA(gBRCA)突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。
219	注射用维迪西妥单抗	限：1.至少接受过2个系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌(包括胃食管结合部腺癌)；2.既往接受过含铂化疗且HER2过表达局部晚期或转移性尿路上皮癌。
220	维奈克拉片	限成人急性髓系白血病患者。
221	注射用卡非佐米	限与地塞米松联合适用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，患者既往至少接受过2种治疗，包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂。
222	羟乙磺酸达尔西利片	限：1.激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者；2.与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗；3.与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。
223	塞利尼索片	限：1.既往接受过治疗且对至少一种蛋白酶体抑制剂，一种免疫调节剂以及一种抗CD38单抗难治的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者；2.既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者。
224	磷酸索立德吉胶囊	限不宜手术或放疗，以及手术或放疗后复发的局部晚期基底细胞癌(BCC)成年患者。

225	注射用埃普奈明	限既往接受过至少2种系统性治疗方案的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，既往含免疫调节剂方案难治的患者不宜接受本联合方案治疗。
226	醋酸戈舍瑞林缓释植入剂	
227	注射用醋酸曲普瑞林微球	限：1.需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者；2.子宫内膜异位症（I至IV期）。
228	注射用戈舍瑞林微球	限：1.需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者；2.可用激素治疗的绝经前期及围绝经期妇女的乳腺癌。
229	阿帕他胺片	限：1.转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者；2.有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。
230	达罗他胺片	限：1.治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者；2.联合多西他赛治疗转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者。
231	瑞维鲁胺片	限转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)患者。
232	注射用醋酸地加瑞克	限需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。
233	硫培非格司亭注射液	限既往化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。
234	艾贝格司亭 α 注射液	限既往化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。
235	拓培非格司亭注射液	限既往化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。
236	艾加莫德 α 注射液	限乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的成人全身型重症肌无力(gMG)患者。
237	注射用泰它西普	限：1.在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者；2.抗乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的成人全身型重症肌无力(gMG)患者。
238	甲磺酸贝舒地尔片	限对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的12岁及以上慢性移植物抗宿主病患者。
239	依那西普注射液	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者。
240	司库奇尤单抗注射液	限：1.符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的6岁及以上患者；2.常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎的成年患者；3.既往传统的改善病情抗风湿药(cDMARDs)疗效不佳或不耐受的活动性银屑病关节炎成人患者；4.中重度化脓性汗腺炎成人患者。
241	乌司奴单抗注射液	限：1.对环孢素、甲氨蝶呤(MTX)等其他系统性治疗或PUVA(补骨脂素和紫外线A)不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者；2.对其他系统性治疗或光疗应答不足或无法耐受的6岁及以上儿童和青少年中重度斑块状银屑病患者；3.对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。
242	乌司奴单抗注射液(静脉输注)	限对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF- α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。
243	依奇珠单抗注射液	限：1.适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成人患者；2.常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎成人患者。
244	古塞奇尤单抗注射液	限：1.适合系统性治疗的成人中重度斑块状银屑病；2.对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的成人中度至重度活动性克罗恩病；3.对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的成人中度至重度活动性溃疡性结肠炎。

245	佩索利单抗注射液	限成人泛发性脓疱型银屑病(GPP)。
246	替瑞奇珠单抗注射液	限适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者。
247	注射用司妥昔单抗	限人体免疫缺陷病毒(HIV)阴性和人疱疹病毒8型(HHV-8)阴性的多中心Castleman病(MCD)成人患者。
248	萨特利珠单抗注射液	限≥12岁青少年及成人患者水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)。
249	盐酸奥扎莫德胶囊	限成人复发型多发性硬化。
250	乌帕替尼缓释片	限: 1.12岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗; 2.活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗; 3.中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗; 4.对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者; 5.对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性克罗恩病成人患者; 6.对非甾体抗炎药(NSAID)应答不佳且存在客观炎症征象(表现为C反应蛋白[CRP]升高和/或磁共振成像[MRI]异常)的活动性放射学阴性中轴型脊柱关节炎(nr-axSpA)成人患者; 7.对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受的活动性强直性脊柱炎(AS, 放射学阳性中轴型脊柱关节炎)成人患者。
251	氘可来昔替尼片	限适合系统治疗或光疗的成年中重度斑块状银屑病患者。
252	奥法妥木单抗注射液	限成人复发型多发性硬化(RMS)。
253	注射用贝利尤单抗	限: 1.在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如: 抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分≥8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5岁及以上患者; 2.与常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者。
254	伊奈利珠单抗注射液	限抗水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)成人患者。
255	注射用维得利珠单抗	限: 1.对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α)抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎的成年患者; 2.对传统治疗或TNF α 抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病的成年患者。
256	西罗莫司凝胶	限成人和6岁及以上儿童患者的结节性硬化症相关面部血管纤维瘤。
257	依库珠单抗注射液	限: 1.阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)的患者; 2.非典型溶血性尿毒症综合征(aHUS)的患者; 3.抗乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的难治性全身型重症肌无力(gMG)成人患者。
258	盐酸伊普可泮胶囊	限: 1.阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)成人患者; 2.C3肾小球病(C3G)成人患者。
259	右酮洛芬氨丁三醇注射液	限成人不适合口服给药的急性中度至重度术后疼痛。
260	酮洛芬凝胶贴膏	限骨关节炎。
261	米诺膦酸片	
262	纳鲁索拜单抗注射液	限不可手术切除或手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤成人患者。
263	诺西那生钠注射液	限5q脊髓性肌萎缩症。
264	利司扑兰口服溶液用散	限治疗16日龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)。
265	丁甘交联玻璃酸钠注射液	限对非药物保守治疗及单纯止痛药物治疗(如对乙酰氨基酚)疼痛缓解效果欠佳的膝骨关节炎(OA)成人患者。
266	环泊酚注射液	限: 1.非气管插管的手术/操作中的镇静和麻醉; 2.全身麻醉诱导和维持; 3.重症监护期间机械通气时的镇静。

267	注射用磷丙泊酚二钠	限成人全身麻醉的诱导。
268	布比卡因脂质体注射液	限: 1.12岁及以上的患者单剂量浸润产生术后局部镇痛; 2.成人肌间沟臂丛神经阻滞产生术后区域镇痛; 3.成人腘窝坐骨神经阻滞产生术后区域镇痛; 4.成人收肌管阻滞产生术后区域镇痛。
269	盐酸氢吗啡酮缓释片	限成人重度疼痛。
270	富马酸奥赛利定注射液	
271	富马酸泰吉利定注射液	限术后中重度疼痛。
272	普瑞巴林缓释片	
273	苯磺酸克利加巴林胶囊	限: 1.治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛; 2.带状疱疹后神经痛。
274	苯磺酸美洛加巴林片	限成人糖尿病性周围神经病理性疼痛。
275	地西洋鼻喷雾剂	限6岁及以上儿童和成人癫痫患者的从集性癫痫发作/急性反复性癫痫发作的急性治疗。
276	布立西坦片	限16岁及以上癫痫患者部分性发作的单药治疗和添加治疗。
277	司替戊醇干混悬剂	限婴儿严重肌阵挛性癫痫(SMEI, Dravet综合征)患者。
278	氟哌啶醇口服溶液	限: 1.急、慢性各型精神分裂症、躁狂症、抽动秽语综合症的成人患者; 2.13至17岁青少年精神分裂症患者; 3.6至17岁儿童和青少年孤独症或广泛性发育障碍的攻击行为; 4.10至17岁儿童和青少年的
279	注射用利培酮微球(Ⅱ)	限急性和慢性精神分裂症以及其他各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状。
280	氘丁苯那嗪片	限治疗成人: 与亨廷顿病有关的舞蹈病; 迟发性运动障碍。
281	棕榈帕利哌酮酯注射液(3M)	限接受过棕榈酸帕利哌酮注射液(1个月剂型)至少4个月充分治疗的精神分裂症患者。
282	注射用阿立哌唑	
283	棕榈帕利哌酮酯注射液(6M)	限接受过棕榈酸帕利哌酮注射液(3M)至少3个月充分治疗的成人精神分裂症患者。
284	氯巴占片	限2岁及以上Lennox-Gastaut综合征(LGS)患者癫痫发作的联合治疗。
285	注射用甲苯磺酸瑞马唑仑	限: 1.非气管插管手术/操作中的镇静和麻醉; 2.全身麻醉的诱导和维持。
286	注射用苯磺酸瑞马唑仑	限: 1.非气管插管的手术/操作中的镇静和麻醉; 2.全身麻醉诱导与维持。
287	水合氯醛/糖浆组合包装	限儿童检查、操作前的镇静、催眠。
288	咪达唑仑口服溶液	限: 1.儿童诊断或治疗性操作前以及操作过程中的镇静/抗焦虑/遗忘; 2.儿童术前镇静/抗焦虑/遗忘。
289	咪达唑仑口颊粘膜溶液	
290	地西泮胶囊	限失眠患者。
291	水合氯醛糖浆	限儿童检查、操作前的镇静、催眠。
292	盐酸氟西汀口服溶液	
293	盐酸曲唑酮缓释片	
294	琥珀酸地文拉法辛缓释片	
295	盐酸托鲁地文拉法辛缓释片	
296	盐酸可乐定缓释片	限6-17岁儿童和青少年的注意缺陷多动障碍(ADHD)。
297	盐酸美金刚口溶膜	
298	注射用尤瑞克林	限轻-中度急性血栓性脑梗死, 应在发作48小时内开始使用, 支付不超过21天。
299	依达拉奉右莰醇注射用浓溶液	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用, 支付不超过14天。

300	丁苯酞软胶囊	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作72小时内开始使用，支付不超过20天。
301	丁苯酞氯化钠注射液	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用，支付不超过14天。
302	氯苯唑酸软胶囊	限成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病(ATTR-CM)。
303	利鲁唑口服混悬液	限肌萎缩侧索硬化(ALS)。
304	盐酸替洛利生片	限发作性睡病6岁及以上患者。
305	苯环喹溴铵鼻喷雾剂	限变应性鼻炎。
306	乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂	限慢性阻塞性肺病(COPD)。
307	茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊(茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂)	限成人慢性阻塞性肺疾病(COPD)。
308	格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。
309	布地格福吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。
310	氟替美维吸入粉雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。
311	倍氯福格吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺病。
312	茚达格莫吸入粉雾剂(II)	限未能充分控制的成年哮喘患者。
313	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II)	
314	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(III)	
315	孟鲁司特钠口溶膜	限：1.1岁至14岁儿童哮喘的预防和长期治疗；2.2岁至14岁儿童季节性过敏性鼻炎和常年性过敏性鼻炎。
316	注射用奥马珠单抗	限：1.经吸入型糖皮质激素和长效吸入型β2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘的6岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据；2.H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。
317	美泊利珠单抗注射液	限：1.鼻内皮质类固醇的附加维持治疗药物，用于治疗全身性皮质类固醇和/或手术治疗无法充分控制疾病的慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)成人患者；2.成人和12岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘(SEA)的维持治疗；3.成人嗜酸性肉芽肿性多血管炎(EGPA)。
318	注射用奥马珠单抗α	限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型β2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘的15岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据。
319	奥马珠单抗注射液	限：1.经吸入型糖皮质激素和长效吸入型β2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘的6岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据；2.H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。
320	盐酸非索非那定干混悬剂	
321	盐酸利多卡因眼用凝胶	
322	地塞米松玻璃体内植入剂	限：1.视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿；2.糖尿病性黄斑水肿(DME)。 应同时符合以下条件：1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3.事前审查后方可使用，初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据；4.每眼累计最多支付5支，每个年度最多支付2支。

323	康柏西普眼用注射液	限:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD); 2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害; 3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害; 4.继发于视网膜静脉阻塞(RVO)(视网膜分支静脉阻塞(BRVO)或视网膜中央静脉阻塞(CRVO)的黄斑水肿引起的视力损伤。 应同时符合以下条件: 1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; 2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5; 3.事前审查后方可使用, 初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; 4.每眼累计最多支付9支, 第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。
324	雷珠单抗注射液	限: 1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD); 2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害; 3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害; 4.继发于视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿引起的视力损害。 应同时符合以下条件: 1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; 2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5; 3.事前审查后方可使用, 初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; 4.每眼累计最多支付9支, 第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。
325	氟轻松玻璃体内植入剂	限累及眼后段的慢性非感染性葡萄膜炎。
326	法瑞西单抗注射液	限: 1.糖尿病性黄斑水肿(DME); 2.新生血管性(湿性)年龄相关性黄斑变性(nAMD); 3.继发于视网膜静脉阻塞(RVO)(视网膜分支静脉阻塞(BRVO)、视网膜中央静脉阻塞(CRVO)或半侧视网膜静脉阻塞(HRVO))的黄斑水肿。 应同时符合以下条件: 1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; 2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5; 3.事前审查后方可使用, 初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; 4.每眼累计最多支付9支, 第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。
327	环孢素滴眼液(Ⅱ)	限干眼症。
328	复方电解质眼内冲洗液	
329	肠内营养乳剂(SP)	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且应为不能经饮食补充足够营养的患者方予支付。
330	地拉罗司颗粒	限: 1.年龄大于2岁的 β -地中海贫血患者; 2.10岁及10岁以上非输血依赖性地中海贫血综合征患者。
331	环硅酸锆钠散	限成人高钾血症。
332	蔗糖羟基氧化铁咀嚼片	限: 1.接受血液透析(HD)或腹膜透析(PD)的成人慢性肾脏病(CKD)患者; 2.12岁及以上CKD4-5期(定义为肾小球滤过率 $< 30 \text{ mL/min/1.73 m}^2$)或接受透析的CKD儿科患者。
333	注射用盐酸曲拉西利	限既往未接受过系统性化疗的广泛期小细胞肺癌(在接受含铂类药物联合依托泊苷方案治疗前给药)患者。
334	盐酸纳呋拉啡口崩片	限现有治疗疗效不理想的血液透析患者的瘙痒症。
335	重组结核杆菌融合蛋白(EC)	
336	注射用全氟丙烷人血白蛋白微球	
337	注射用全氟丁烷微球	限肝脏局灶性病变血管相和Kupffer相的超声成像。
338	治疗用碘[131I]化钠胶囊	
339	牛黄清感胶囊	

340	银翘清热片	
341	小儿豉翘清热糖浆	
342	芪黄通秘软胶囊	益气养血，润肠通便。用于功能性便秘证属虚秘者。
343	济川煎颗粒	
344	冬凌草滴丸	清热解毒，消肿散结，利咽止痛。用于热毒壅盛所致的咽喉肿痛、声音嘶哑；急性扁桃体炎、急性咽炎轻症见上述证候者。
345	金银花口服液	
346	蓝芩口服液	
347	清肺排毒颗粒	
348	痰热清胶囊	清热，化痰，解毒。用于风温肺热病属风热袭肺证，症见发热，恶风，咳嗽，咯痰，或咽痛，流涕，口干等。
349	枳实总黄酮片	
350	小儿荆杏止咳颗粒	
351	九味止咳口服液	
352	小儿紫贝宣肺糖浆	
353	金花清感颗粒	疏风宣肺，清热解毒。用于单纯型流行性感冒轻症，中医辨证属风热犯肺证者，症见发热，头痛，全身酸痛，咽痛，咳嗽，恶风或恶寒，鼻塞流涕，舌质红，舌苔薄黄，脉数。在新型冠状病毒肺炎的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。
354	化湿败毒颗粒	化湿解毒，宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病，症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。
355	宣肺败毒颗粒	宣肺化湿，清热透邪，泻肺解毒。用于湿毒郁肺所致的疫病。症见发热，咳嗽，咽部不适，喘促气短，乏力，纳呆，大便不畅；舌质暗红、苔黄腻或黄燥，脉滑数或弦滑。
356	散寒化湿颗粒	散寒化湿、宣肺透邪、辟秽化浊、解毒通络。用于寒湿郁肺所致疫病，症见发热，乏力，周身酸痛，咳嗽，咯痰，胸闷憋气，纳呆，恶心，呕吐，腹泻，大便粘腻不爽；舌质淡胖齿痕或淡红，舌苔白厚腻或腐腻，脉滑或濡。
357	小儿牛黄清心散	限高热神昏的急救、抢救时使用。
358	一贯煎颗粒	
359	参乌益肾片	限慢性肾衰竭患者。
360	桑枝总生物碱片	
361	通脉降糖胶囊	
362	参龙宁心胶囊	限冠心病和成年人恢复期病毒型心肌炎出现的轻度或中度室性过早搏动见上述证候者。
363	芪蛭益肾胶囊	
364	注射用益气复脉(冻干)	限二级及以上医疗机构冠心病心绞痛及冠心病所致左心功能不全Ⅱ-Ⅲ级的患者，住院方可支付，单次最多支付14天。
365	益肾养心安神片	

366	杜蛭丸	
367	丹红注射液	限二级及以上医疗机构。
368	注射用丹参多酚酸	限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者，住院方可支付，单次最多支付14天。
369	注射用丹参多酚酸盐	限二级及以上医疗机构。
370	血必净注射液	限二级及以上医疗机构。
371	丹灯通脑软胶囊	
372	蛭蛇通络胶囊	益气活血，息风通络。用于中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期气虚血瘀证。症见半身不遂，偏身麻木，口舌歪斜，舌强语蹇，自汗、气短乏力，脉沉细涩或弦。
373	解郁除烦胶囊	
374	参葛补肾胶囊	益气、养阴、补肾。适用于轻、中度抑郁症中医辨证属气阴两虚、肾气不足证，症见情绪低落、多思善虑、言语动作减少、目光迟滞、健忘、食少、心悸胆怯、少寐多梦、心烦，舌质淡红或偏红、舌苔白或花剥，脉细弱等。
375	七蕊胃舒胶囊	
376	虎贞清风胶囊	清热利湿，化瘀利浊，滋补肝肾。用于轻中度急性痛风性关节炎。中医辨证属湿热蕴结证，症见关节疼痛、肿胀、发热、活动受限、口渴、烦闷不安，舌红、苔黄或黄腻、脉滑数。
377	秦威颗粒	清热除湿祛风，活血通络止痛。用于急性痛风性关节炎风湿郁热证，症见关节疼痛、关节肿胀、关节局部发热、口渴喜饮，舌质红、苔黄、脉滑数。
378	广金钱草总黄酮胶囊	清热祛湿，利尿排石。用于输尿管结石中医辨证属湿热蕴结证者。
379	降脂通络软胶囊	活血行气，降脂祛浊。用于高脂血症属血瘀气滞证者，症见胸胁胀痛、心前区刺痛、胸闷、舌尖边有瘀点或瘀斑、脉弦或涩。
380	黄蜀葵花总黄酮口腔贴片	清心泄热。用于心脾积热所致轻型复发性口腔溃疡(轻型复发性阿弗他溃疡)，症见口腔黏膜溃疡局部红肿、灼热疼痛等。
381	连榆烧伤膏	清热解毒，生肌止痛。用于浅Ⅱ°、深Ⅱ°烧烫伤创面的治疗，用药面积不宜超出体表面积的1%。
382	儿茶上清丸	清热退火，解毒敛疮，止痛。用于轻型复发性阿弗他溃疡上焦实热证。症见：口舌生疮，溃疡疼痛，口渴欲饮，口粘口臭，舌质红，舌苔黄或黄腻，脉弦洪或弦数。
383	复方黄黛片	限初治的急性早幼粒细胞白血病。
384	康莱特注射液	限二级及以上医疗机构。
385	康艾注射液	限二级及以上医疗机构说明书标明恶性肿瘤的中晚期治疗。
386	淫羊藿素软胶囊	限不适合或患者拒绝接受标准治疗,且既往未接受过全身系统性治疗的、不可切除的肝细胞癌，患者外周血复合标志物满足以下检测指标的至少两项：AFP≥400 ng/mL；TNF- α < 2.5 pg/mL；IFN- γ ≥
387	注射用黄芪多糖	限二级及以上医疗机构肿瘤患者，住院方可支付，单次最多支付14天。
388	温经汤颗粒	
389	芪胶调经颗粒	益气补血、止血调经。用于上环所致经期延长中医辨证属气血两虚证，症见经血过期不净，月经色淡，神疲乏力，头晕眼花，少腹坠胀，舌淡苔薄白、脉细弱。
390	通络明目胶囊	限2型糖尿病视网膜病变单纯性型。

391	益气通窍丸	
392	五虎口服液	
393	玄七健骨片	
394	关黄母颗粒	补益肝肾，滋阴降火。用于女性更年期综合征(绝经前后诸证)中医辨证属肝肾阴虚证，症见烘热汗出，头晕，耳鸣，腰膝酸软或足跟痛，少寐多梦，急躁易怒等。
395	坤心宁颗粒	
396	如意珍宝片	
397	注射用右兰索拉唑	限伴有出血的胃、十二指肠溃疡。
398	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅰ)	限活动性十二指肠溃疡或胃食管反流病。
399	富马酸伏诺拉生片	限：1.反流性食管炎；2.与适当的抗生素联用以根除幽门螺杆菌。
400	阿瑞匹坦注射液	限放化疗。
401	注射用福沙匹坦双葡甲胺	限放化疗。
402	甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液	限AST或ALT大于120U/L的患者。
403	精氨酸谷氨酸注射液	限肝性脑病。
404	硫酸镁钠钾口服用浓溶液	
405	利那洛肽胶囊	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。
406	盐酸二甲双胍缓释片(Ⅲ)	
407	二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)	
408	阿卡波糖咀嚼片	
409	达格列净片	
410	艾托格列净片	限二线用药。
411	艾塞那肽注射液	限2型糖尿病。
412	利拉鲁肽注射液	限2型糖尿病。
413	利司那肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
414	艾地骨化醇软胶囊	限绝经后女性骨质疏松症。
415	复合磷酸氢钾注射液	
416	氯化钾口服溶液	
417	盐酸乙酰左卡尼汀片	限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。
418	铝镁匹林片(Ⅱ)	
419	氯吡格雷阿司匹林片	
420	曲前列尼尔注射液	限肺动脉高压(PAH，WHO分类I)。
421	注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂衍生物	限急性心肌梗死发病12小时内、脑梗死发病4.5小时内的溶栓治疗。
422	注射用重组人尿激酶原	限急性心肌梗死发病12小时内使用。
423	甲苯磺酸艾多沙班片	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。

424	艾曲泊帕乙醇胺片	限：1.既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者；2.既往对免疫抑制治疗缓解不充分的重型再生障碍性贫血(SAA)患者。
425	马来酸阿伐曲泊帕片	限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。
426	人凝血因子IX	限凝血因子IX缺乏症(B型血友病)患者的出血治疗。
427	罗沙司他胶囊	限慢性肾脏病(CKD)引起的贫血。
428	复方氨基酸注射液(14AA-SF)	
429	复方氨基酸(15AA-II)/葡萄糖(10%)电解质注射液	
430	复方氨基酸注射液(18AA-V-SF)	
431	碳酸氢钠林格注射液	
432	氨基酸(15)腹膜透析液	
433	醋酸艾替班特注射液	限成人、青少年和≥2岁儿童的遗传性血管性水肿(HAE)急性发作。
434	瑞加诺生注射液	
435	波生坦分散片	限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者。
436	利奥西呱片	限：1.术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的CTEPH，且(WHO FC)为II-III的患者；2.动脉性肺动脉高压(PAH)且(WHO FC)为II-III患者的二线用药。
437	马昔腾坦片	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。
438	托伐普坦片	
439	盐酸艾司洛尔氯化钠注射液	
440	比索洛尔氨氯地平片	
441	阿齐沙坦片	
442	沙库巴曲缬沙坦钠片	限：1.射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHA II-IV级，LVEF≤40%)成人患者；2.原发性高血压。
443	米拉贝隆缓释片	
444	去氨加压素口服溶液	
445	注射用醋酸奥曲肽微球	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症。
446	注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液	
447	注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液	
448	注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠	
449	小儿法罗培南钠颗粒	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。
450	苹果酸奈诺沙星胶囊	限二线用药。
451	注射用多黏菌素E甲磺酸钠	
452	吗啉硝唑氯化钠注射液	限二线用药。
453	泊沙康唑口服混悬液	限：1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染；2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病；3.接合菌纲类感染。
454	泊沙康唑肠溶片	
455	泊沙康唑注射液	

456	注射用硫酸艾沙康唑	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。
457	富马酸贝达喹啉片	限耐多药结核患者。
458	德拉马尼片	限耐多药结核患者。
459	富马酸丙酚替诺福韦片	
460	恩替卡韦口服溶液	限慢性乙型肝炎成人患者或2岁至<18岁慢性HBV感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者。
461	奈韦拉平齐多拉米双夫定片	限艾滋病病毒感染。
462	注射用艾博韦泰	限艾滋病病毒感染。
463	来特莫韦片	限接受异基因造血干细胞移植(HSCT)的巨细胞病毒(CMV)血清学阳性的成人和6个月及以上且体重 ≥ 6 kg的儿童受者[R+]预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病。
464	重组细胞因子基因衍生蛋白注射液	限HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者。
465	法维拉韦片(又称:法匹拉韦片)	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。
466	玛巴洛沙韦片	限成人和5岁及以上儿童单纯性甲型和乙型流感患者, 或存在流感相关并发症高风险的成人和12岁及以上儿童流感患者。
467	注射用紫杉醇脂质体	限: 1.卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗、作为一线化疗, 也可与顺铂联合应用; 2.用于曾用过含阿霉素标准化疗的乳腺癌患者的后续治疗或复发患者的治疗; 3.可与顺铂联合用于不能手术或放疗的非小细胞肺癌患者的一线化疗。
468	尼洛替尼胶囊	限: 1.新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者; 2.既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。
469	达可替尼片	限表皮生长因子受体(EGFR)19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。
470	甲磺酸奥希替尼片	限: 1. I B-III A期存在表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗, 患者须既往接受过手术切除治疗, 并由医生决定接受或不接受辅助化疗; 2.具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗; 3.既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展, 并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗; 4.联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。
471	塞瑞替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。
472	克唑替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。
473	哌柏西利胶囊	限激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌。
474	马来酸奈拉替尼片	限人类表皮生长因子受体2(HER2)阳性的早期乳腺癌成年患者, 在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。
475	阿昔替尼片	

476	伊布替尼胶囊	限：1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗；2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗；3.华氏巨球蛋白血症患者的治疗，按说明书用药。
477	培唑帕尼片	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。
478	甲磺酸仑伐替尼胶囊	
479	瑞戈非尼片	限：1.肝细胞癌二线治疗；2.转移性结直肠癌三线治疗；3.胃肠道间质瘤三线治疗。
480	阿伐替尼片	限携带血小板衍生生长因子受体α(PDGFRα)外显子18突变(包括PDGFRA D842V突变)的不可切除或转移性胃肠道间质瘤(GIST)成人患者。
481	帕妥珠单抗注射液	限以下情况方可支付，且支付不超过12个月：1.HER2阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗；2.具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。
482	枸橼酸伊沙佐米胶囊	限治疗已接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成人患者。
483	培门冬酶注射液	
484	奥拉帕利片	限：1.携带胚系或体细胞BRCA突变的(gBRCAm或sBRCAm)晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2.同源重组修复缺陷(HRD)阳性的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一一线含铂化疗联合贝伐珠单抗治疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；3.铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；4.携带胚系或体细胞BRCA突变(gBRCAm或sBRCAm)且既往治疗(包括一种新型内分泌药物)失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者的治疗；5.接受过新辅助或辅助化疗的携带有害或疑似有害胚系BRCA突变(gBRCAm)、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性早期高风险乳腺癌成人患者的辅助治疗。
485	甲磺酸艾立布林注射液	限既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。
486	恩扎卢胺软胶囊	
487	阿普米司特片	限符合接受光疗或系统性治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者。
488	阿达木单抗注射液	
489	注射用英夫利西单抗	
490	西尼莫德片	限成人复发型多发性硬化的患者。
491	盐酸芬戈莫德胶囊	限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。
492	巴瑞替尼片	限：1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；2.对一种或多种既往传统合成或生物DMARDs应答不佳或不耐受的2岁及以上活动性幼年特发性关节炎患者，包括：(1)多关节型幼年特发性关节炎(多关节型类风湿因子阳性[RF+]或阴性[RF-]，扩展型少关节炎),(2)附着点炎相关关节炎,(3)幼年银屑病关节炎。可单药使用或与甲氨蝶呤联合用药。
493	托法替布片	
494	枸橼酸托法替布缓释片	

495	依维莫司片	限：1.既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者；2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者；3.无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤(NET)成人患者；4.需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症(TSC)相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA)成人和儿童患者；5.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者；6.来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的激素受体阳性、表皮生长因子受体-2阴性、绝经后晚期
496	特立氟胺片	限常规治疗无效的多发性硬化患者。
497	富马酸二甲酯肠溶胶囊	限成人复发型多发性硬化(RMS)。
498	泊马度胺胶囊	限既往接受过至少两种治疗(包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂)，且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。
499	乙磺酸尼达尼布软胶囊	限：1.特发性肺纤维化(IPF)；2.系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)；3.具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病。
500	地舒单抗注射液	
501	盐酸艾司氯胺酮注射液	限用于与镇静麻醉药联合诱导和实施全身麻醉。
502	利多卡因凝胶贴膏	限带状疱疹患者。
503	普瑞巴林口服溶液	
504	拉考沙胺注射液	
505	吡仑帕奈片	
506	盐酸鲁拉西酮片	
507	富马酸喹硫平缓释片	
508	奥氮平口溶膜	
509	氨磺必利口服溶液	
510	阿立哌唑口溶膜	
511	布南色林片	
512	水合氯醛灌肠剂	限儿童。
513	盐酸右美托咪定鼻喷雾剂	限：1.成人术前镇静/抗焦虑；2.2-6周岁儿童全麻手术前的镇静/抗焦虑。
514	盐酸安非他酮缓释片(Ⅱ)	
515	依达拉奉氯化钠注射液	限肌萎缩侧索硬化(ALS)。
516	氨吡啶缓释片	限多发性硬化合并步行障碍(EDSS评分4-7分)的成年患者。
517	盐酸奥洛他定颗粒	
518	盐酸丙卡特罗粉雾剂	
519	盐酸丙卡特罗吸入溶液	
520	盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液	
521	盐酸溴己新口服溶液	
522	福多司坦口服溶液	

523	布林佐胺噻吗洛尔滴眼液	限二线用药。
524	布林佐胺溴莫尼定滴眼液	限二线用药。
525	他氟前列素滴眼液	
526	阿柏西普眼内注射溶液	限：1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD)；2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害。应同时符合以下条件：1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3.事前审查后方可使用，初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据；4.每眼累计最多支付9支，第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。
527	多种微量元素注射液(Ⅲ)	限与肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付。
528	舒更葡糖钠注射液	
529	地拉罗司分散片	
530	碳酸司维拉姆片	
531	碳酸镧咀嚼片	
532	吸入用氯醋甲胆碱	
533	疏清颗粒	
534	柴芩清宁胶囊	
535	清胃止痛微丸	
536	熊胆舒肝利胆胶囊	
537	热炎宁合剂	
538	鸡骨草胶囊	
539	利胆止痛胶囊	
540	五味苦参肠溶胶囊	
541	连花清咳片	
542	麻芩消咳颗粒	
543	射麻口服液	
544	缓痛止泻软胶囊	
545	甘海胃康胶囊	
546	苓桂术甘颗粒	温阳化饮，健脾利湿。用于中阳不足之痰饮。症见胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉
547	百令胶囊	限慢性支气管炎、慢性肾功能不全的患者。
548	芪黄颗粒	
549	心脉隆注射液	限二级及以上医疗机构慢性心力衰竭患者。
550	八味芪龙颗粒	限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。
551	脑心安胶囊	限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。
552	芪丹通络颗粒	
553	芪芎通络胶囊	限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。

554	蒺藜皂苷胶囊	限中风病中经络(轻中度脑梗死)恢复期患者。
555	西红花总苷片	限化疗产生的胸痹心痛(冠心病、心绞痛)心血瘀阻证患者。
556	银杏内酯注射液	限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,住院方可支付,单次最多支付14天。
557	银杏二萜内酯葡胺注射液	限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,住院方可支付,单次最多支付14天。
558	芍麻止痉颗粒	
559	川芎清脑颗粒	
560	食道平散	限中晚期食道癌所致食道狭窄梗阻的患者。
561	参一胶囊	限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。
562	筋骨止痛凝胶	
563	安儿宁颗粒	
564	红花如意丸	
565	西格列汀二甲双胍缓释片	
566	二甲双胍恩格列净片(Ⅲ)	限2型糖尿病患者。
567	二甲双胍恩格列净片(Ⅵ)	限2型糖尿病患者。
568	氢溴酸替格列汀片	
569	骨化三醇口服溶液	限: 1.绝经后骨质疏松; 2.慢性肾功能衰竭,尤其是接受血液透析患者之肾性骨营养不良症; 3.术后甲状腺功能低下; 4.特发性甲状腺功能低下; 5.假性甲状腺功能低下; 6.维生素D依赖性佝偻病; 7.低血磷性维生素D抵抗型佝偻病等。
570	尼替西农胶囊	限成人和儿童酪氨酸血症Ⅰ型(HT-1)。
571	复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液	
572	山梨醇甘露醇冲洗剂	限经尿道前列腺切除术及其他泌尿外科手术的术中冲洗。
573	非诺贝特酸胆碱缓释胶囊	限: 成人控制饮食基础上: 1.降低重度高甘油三酯血症患者甘油三酯(TG)水平; 2.原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常患者的治疗。
574	注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液	
575	注射用头孢他啶阿维巴坦钠	
576	磷酸特地唑胺片	限急性细菌性皮肤及皮肤软组织感染。
577	曲氟尿苷替匹嘧啶片	限: 既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗,以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子(VEGF)治疗、抗表皮生长因子受体(EGFR)治疗(RAS野生型)的转移性结直肠癌(mCRC)
578	他克莫司颗粒	限: 1.预防儿童肝脏或肾脏移植术后的移植物排斥反应; 2.治疗儿童肝脏或肾脏移植术后应用其他免疫抑制药物无法控制的移植物排斥反应。
579	氨己烯酸口服溶液用散	限婴儿痉挛症。
580	丁苯那嗪片	限亨廷顿病相关的舞蹈症。
581	盐酸右美托咪定氯化钠注射液	限: 1.重症监护患者插管和机械通气时的镇静; 2.非插管患者术前和/或术中以及其他程序镇静。
582	草酸艾司西酞普兰口服溶液	
583	氯苯唑酸葡胺软胶囊	限成人转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病I期症状患者。

584	氮卓斯汀氟替卡松鼻喷雾剂	限12岁及以上单一鼻用抗组胺药或糖皮质激素治疗效果不佳的中至重度季节性过敏性鼻炎和常年性过敏性鼻炎患者。
585	吸入用盐酸氨溴索溶液	
586	全氟己基辛烷滴眼液	限睑板腺功能障碍相关干眼。
587	鱼油(3%)橄榄油中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
588	雌二醇地屈孕酮片	
589	斯泰度塔单抗注射液	限成人破伤风紧急预防。
590	安瑞克芬注射液	限腹部手术后的轻、中度疼痛。
591	布西珠单抗注射液	限糖尿病黄斑水肿(DME)。 应同时符合以下条件: 1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; 2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5; 3.事前审查后方可使用, 初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; 4.每眼累计最多支付9支, 第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。
592	替妥尤单抗N01注射液	限中重度甲状腺眼病。
593	锝[99mTc]替曲膦注射液	
594	玛舒拉沙韦片	限既往健康的12岁及以上青少年和成人单纯性甲型和乙型流感患者的治疗, 不包括存在流感相关并发症高风险的患者。
595	昂拉地韦片	限成人单纯型甲型流感患者的治疗, 不包括存在流感相关并发症高风险的患者。
596	普托马尼片	限耐多药结核患者。
597	甲磺酸普雷福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。
598	恩曲利匹丙诺片	限艾滋病病毒感染。
599	醋酸来法莫林注射用浓溶液	限成人社区获得性肺炎。
600	醋酸来法莫林片	限成人社区获得性肺炎。
601	注射用亚胺培南西司他丁钠/氯化钠注射液	限头孢菌素耐药或重症感染患者。
602	注射用美罗培南/氯化钠注射液	
603	盐酸万古霉素胶囊	
604	注射用氨曲南阿维巴坦钠	限18岁及以上患者由敏感革兰阴性菌引起的治疗药物选择有限或无替代治疗的下列感染: 1.复杂性腹腔感染(cIAI); 2.医院获得性肺炎(HAP), 包括呼吸机相关性肺炎(VAP)。
605	盐酸替那帕诺片	限对磷结合剂疗效不充分或不耐受的慢性肾脏病(CKD)成人透析患者。
606	依伏卡塞片	限维持性透析患者的继发性甲状旁腺功能亢进症。
607	戊二酸利那拉生酯胶囊	限反流性食管炎。
608	怡培生长激素注射液	限3岁及以上儿童的生长激素缺乏症所致的生长缓慢。
609	瑞格列汀二甲双胍片(I)	
610	瑞格列汀二甲双胍片(II)	

611	依苏帕格鲁肽 α 注射液	限成人2型糖尿病患者的血糖控制。
612	金培生长激素注射液	限内源性生长激素缺乏(GHD)所引起的儿童生长缓慢。
613	多替诺雷片	限痛风伴高尿酸血症患者。
614	替尔泊肽注射液	限成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。
615	棕榈酸帕利哌酮注射液(Ⅱ)	
616	奥氮平氟西汀胶囊	
617	注射用阿立哌唑微球	
618	氨磺必利口崩片	
619	舒马普坦萘普生钠片	限成人有或无先兆偏头痛的急性发作的治疗。
620	注射用替奈普酶	限脑梗死发病4.5小时内的溶栓治疗。
621	注射用阿格司亭 α	限既往化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。
622	本瑞利珠单抗注射液	限成人和12岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘(SEA)的维持治疗。
623	阿地溴铵吸入粉雾剂	
624	盐酸胍法辛缓释片	限6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍(ADHD)。
625	盐酸右哌甲酯缓释胶囊	限6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍(ADHD)。
626	奥瑞利珠单抗注射液	限：1.成人复发型多发性硬化；2.成人原发进展型多发性硬化。
627	磷苯妥英钠注射用浓溶液	限：1.全身性强直-阵挛性癫痫持续状态；2.当患者无法口服苯妥英钠时，可用于短期替代治疗。
628	沙库巴曲阿利沙坦钙片	限原发性高血压。
629	英克司兰钠注射液	限成人原发性高胆固醇血症(杂合子型家族性和非家族性)或混合型血脂异常患者以下情况方予支付：1.接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者；2.他汀类药物不耐受或禁忌使
630	阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片	
631	伊努西单抗注射液	限接受中等剂量或中等以上剂量他汀类药物治疗后，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者。
632	注射用瑞卡西单抗	限接受中等或以上剂量他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者；或单药用于非家族性高胆固醇血症和混合型血脂异常的成人患者。
633	昂戈瑞西单抗注射液	限接受中等或以上剂量他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者；或在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独或与依折麦布联合用药用于非家族性高胆固醇血症和混合型血脂异常的成人患者。
634	盐酸拉贝洛尔氯化钠注射液	适用于严重高血压。
635	夫那奇珠单抗注射液	限：1.适合接受系统治疗或光疗的中重度斑块状银屑病的成人患者；2.常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎的成人患者。

636	赛立奇单抗注射液	限：1.适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者；2.常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎(放射学阳性中轴型脊柱关节炎)成人患者。
637	依若奇单抗注射液	限对环孢素、甲氨蝶呤(MTX)等其他系统性治疗或PUVA(补骨脂素和紫外线A)不耐受、有禁忌或无法耐受的中度至重度斑块状银屑病的成年患者。
638	硫酸艾玛昔替尼片	限：1.对局部外用治疗或其他系统性治疗应答不充分或不耐受的中重度特应性皮炎成人患者；2.对一种或多种TNF抑制剂疗效不佳或不耐受的中重度活动性类风湿关节炎成人患者；3.对一种或多种TNF抑制剂疗效不佳或不耐受的活动性强直性脊柱炎成人患者。
639	司普奇拜单抗注射液	限：1.外用药控制不佳或不适合外用药治疗的成人中重度特应性皮炎患者；2.糖皮质激素治疗和/或手术治疗控制不佳的慢性鼻窦炎伴鼻息肉成人患者，在鼻用糖皮质激素治疗基础之上使用；3.鼻用糖皮质激素联合抗组胺药物治疗后症状控制不佳的成人中重度季节性过敏性鼻炎患者。
640	利生奇珠单抗注射液	限对传统治疗或生物制剂治疗应答不足、失应答或不耐受的中重度活动性克罗恩病成年患者。
641	古塞奇尤单抗注射液(静脉输注)	限：1.对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病成人患者的诱导治疗；2.对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者的诱导治疗。
642	利生奇珠单抗注射液(皮下注射)	限对传统治疗或生物制剂治疗应答不足、失应答或不耐受的中重度活动性克罗恩病成年患者。
643	盐酸吉卡昔替尼片	限中危或高危原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发性骨髓纤维化(PPV-MF)和原发性血小板增多症继发性骨髓纤维化(PET-MF)的成人患者。
644	艾伏尼布片	限诊断为携带易感异柠檬酸脱氢酶-1(IDH1)突变的复发性或难治性急性髓系白血病(AML)成人患者。
645	马来酸阿可替尼片	限：1.慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)成人患者；2.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。
646	匹妥布替尼片	限既往接受过至少两种系统性治疗(含布鲁顿氏酪氨酸激酶[BTK]抑制剂)的复发或难治性套细胞淋巴瘤(MCL)成人患者。
647	注射用磷罗拉匹坦帕洛诺司琼	限预防成人高度致吐性化疗(HEC)引起的急性和迟发性恶心和呕吐。
648	注射用培妥罗凝血素 α	限：1.儿童甲(A)型血友病；2.成人甲(A)型血友病限出血时使用。
649	去铁酮片	限地中海贫血。
650	艾沙妥昔单抗注射液	限：1.不适合自体干细胞移植(ASCT)的新诊断的多发性骨髓瘤成人患者；2.既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂)的多发性骨髓瘤成人患者。
651	注射用重组人凝血因子Ⅷa N01	限凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5个Bethesda单位(BU)的成人及青少年(12岁以上)先天性血友病患者。
652	格菲妥单抗注射液	限：1.既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者；2.不适合自体造血干细胞移植(ASCT)的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤非特指型(DLBCL NOS)成人患者。
653	利厄替尼片	限：1.具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；2.既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者。
654	盐酸佐利替尼片	限具有表皮生长因子受体(EGFR)19号外显子缺失或外显子21(L858R)置换突变，并伴中枢神经系统(CNS)转移的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。

655	塞纳帕利胶囊	限晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。
656	普拉替尼胶囊	限：1.转染重排(RET)基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者；2.需要系统性治疗的晚期或转移性RET突变型甲状腺髓样癌(MTC)成人和12岁及以上儿童患者；3.需要系统性治疗且放射性碘难治的晚期或转移性RET融合阳性甲状腺癌成人和12岁及以上儿童患者。
657	塞普替尼胶囊	限：1.转染重排(RET)基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者；2.需要系统性治疗的晚期或转移性RET突变型甲状腺髓样癌(MTC)成人和12岁及以上儿童患者；3.需要系统性治疗且放射性碘难治的晚期或转移性RET融合阳性甲状腺癌成人和12岁及以上儿童患者。
658	已二酸他雷替尼胶囊	限ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
659	尼拉帕利阿比特龙片	限携带胚系和/或体系BRCA基因突变的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者(mCRPC)。
660	菲诺利单抗注射液	限：1.复发性和/或转移性头颈部鳞状细胞癌的一线治疗；2.联合贝伐珠单抗用于既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的患者。
661	塔戈利单抗注射液	限：1.既往接受过二线及以上化疗失败的复发或转移性鼻咽癌患者的治疗；2.复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。
662	艾帕洛利托沃瑞利单抗注射液	限既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者。
663	注射用苏维西塔单抗	限铂耐药后接受过不超过1种系统治疗的成人复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的治疗。
664	派安普利单抗注射液	限：1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者；2.局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗；3.既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌成人患者；4.复发或转移性鼻咽癌的一线治疗。
665	注射用芦康沙妥珠单抗	限：1.既往至少接受过2种系统治疗(其中至少1种治疗针对晚期或转移性阶段)的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者；2.经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)和含铂化疗治疗后进展的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
666	吡洛西利片	限：1.与氟维司群联合用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性晚期或转移性乳腺癌成人患者；2.既往转移性阶段接受过两种及以上内分泌治疗和一种化疗后出现疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性晚期或转移性乳腺癌成人患者。
667	注射用瑞康曲妥珠单抗	限存在HER2(ERBB2)激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
668	枸橼酸伏维西利胶囊	限联合氟维司群用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子2(HER2)阴性的复发或转移性成年乳腺癌患者。
669	恩替司他片	限联合芳香化酶抑制剂用于治疗激素受体(HR)阳性、人类表皮生长因子受体-2(HER-2)阴性，经内分泌治疗复发或进展的局部晚期或转移性乳腺癌患者。

670	盐酸来罗西利片	限：1.与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性(HR+/HER2-)局部晚期或转移性乳腺癌成人患者；2.与氟维司群联合用于既往接受内分泌治疗后疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性(HR+/HER2-)局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。
671	醋酸甲地孕酮口服混悬液	限：1.获得性免疫缺陷综合征患者的厌食症；2.获得性免疫缺陷综合征患者及癌症患者恶病质引起的体重明显减轻。
672	紫杉醇口服溶液	限一线含氟尿嘧啶类方案治疗期间或治疗后出现疾病进展的晚期胃癌患者。
673	盐酸伊立替康脂质体注射液(Ⅱ)	限既往经吉西他滨为基础的化疗治疗失败的不可切除的局部晚期或转移性胰腺癌患者的治疗。
674	西妥昔单抗N01注射液	限与FOLFOX或FOLFIRI方案联合用于一线治疗RAS基因野生型的转移性结直肠癌。
675	醋酸阿比特龙片(Ⅱ)	
676	氘恩扎鲁胺软胶囊	限接受醋酸阿比特龙及化疗后出现疾病进展，且既往未接受新型雄激素受体抑制剂的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)成人患者。
677	氟泽雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
678	卡匹色替片	限联合氟维司群用于转移性阶段至少接受过一种内分泌治疗后疾病进展，或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后12个月内复发的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性且伴有一种或多种PIK3CA/AKT1/PTEN改变的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。
679	伊那利塞片	限联合哌柏西利和氟维司群，用于内分泌治疗耐药(包括在辅助内分泌治疗期间或之后出现复发)、PIK3CA突变、激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。
680	枸橼酸戈雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
681	苹果酸法米替尼胶囊	限联合注射用卡瑞利珠单抗用于既往接受含铂化疗治疗失败但未接受过贝伐珠单抗治疗的复发或转移性宫颈癌患者。
682	格索雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。
683	芦沃美替尼片	限：1.2岁及2岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤(PN)的I型神经纤维瘤病(NF1)儿童及青少年患者；2.朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)和组织细胞肿瘤成人患者。
684	复方比那甫西颗粒	
685	芪防鼻通片	益气通窍。用于改善肺脾两虚型持续性变应性鼻炎未合并季节性过敏原者的喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞，舌淡，苔白，脉浮或脉细弱。
686	温阳解毒颗粒	温阳益气，化湿解毒。用于疫病辨证属阳气虚弱，疫毒侵袭，症见发热、咳嗽、胸闷、四肢不温、气短乏力、大便溏薄；舌淡，苔少或白苔，脉沉细或弱。
687	玉女煎颗粒	清胃热，滋肾阴。用于胃热阴虚证。症见头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，或消渴，消谷善饥，舌红苔黄而干，脉浮洪或滑。

688	参郁宁神片	益气养阴、宁神解郁。用于轻、中度抑郁症中医辨证属气阴两虚证者，症见失眠多梦、多疑善惊、口咽干燥，舌淡红或红、苔薄白少津、脉细或沉细等。
689	养血祛风止痛颗粒	补气养血，散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证，症见头痛反复发作、头脑昏沉，以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白，舌淡苔白、脉沉细而弱等。
690	益气清肺颗粒	益气养阴，健脾和中，清热祛湿。适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运，余邪未尽证，症见倦怠乏力、动后气短、干咳少痰、咽喉不利、胃脘痞闷、纳呆便溏，舌淡或红、少津，脉细数。
691	羟考酮纳洛酮缓释片	限成人需阿片类镇痛药才能充分控制的重度疼痛。
692	注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液	
693	呋塞米口服溶液	
694	醋酸氟氢可的松片	限失盐型先天性肾上腺皮质增生症(CAH)及失盐型原发慢性肾上腺皮质功能减退症(Addison病)。
695	熊去氧胆酸口服混悬液	限：1.胆囊胆固醇结石(必须是X射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正常)；2.胆汁淤积性肝病(如：原发性胆汁性肝硬化)；3.胆汁反流性胃炎；4.1月龄至18岁患者的囊性纤维化相关肝病。
696	吡仑帕奈口服混悬液	限成人和4岁及以上儿童癫痫部分性发作患者的治疗。
697	盐酸伊立替康脂质体注射液	限接受吉西他滨治疗后进展的转移性胰腺癌患者。